

### Uso do ecocardiograma transesofágico na avaliação dos pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico

VIVIANE CORDEIRO VEIGA, SALOMON SORIANO ORDINOLA ROJAS, MARCELO LUIZ PATRICIO, AMILTON SILVA JUNIOR, ELIAS CESAR HAUY MARUM, HENRY ABENSUR.

Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência São Paulo SP BRASIL.

No período de um ano, foram realizados em nosso Serviço 855 ecocardiogramas transesofágicos, sendo que 477 (55,79%) pacientes (pts) eram do sexo masculino e 378 (44,21%) do sexo feminino, com idade de  $61,93 \pm 16,11$  anos. A pesquisa de foco embólico foi a indicação em 513 pts (60,0%), sendo que destes, 188 tinham diagnóstico confirmado de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). Os achados do ecocardiograma transesofágico nos pts com diagnóstico de AVCI foram: em 37 pts foram encontradas placas protrusas de ateroma na aorta torácica, em 13 pts havia contraste espontâneo ou trombo nas câmaras esquerdas, em oito, havia forame oval pérvio. Além disso, um paciente era portador de mixoma de átrio esquerdo, em um havia dissecação de aorta ascendente e em três, aneurisma do septo interatrial sem shunt. O ecocardiograma transesofágico não apresentava alterações significativas em 125 pts. **Conclusão:** O ecocardiograma transesofágico identificou o foco embólico em 33,5% dos pacientes, sendo o principal achado a presença de placas protrusas na aorta torácica, sendo portanto, um exame importante na avaliação dos pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico.