

CURSO NEURO INTENSIVISMO- MÓDULO I

*ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS OPERATÓRIO
DE CLIPAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL*

Elaine Moraes

Gerente Unidades Terapia Intensiva

Hospital Beneficência Portuguesa- Unidade São Joaquim



Competências do Enfermeiro

Gerenciamento
da Unidade

Prescrição de
cuidados

Supervisionar a
assistência

Acompanhamento
cuidado de alta
complexidade



Monitorização Neurológica Intensiva

- ❖ Objetiva diagnosticar ou prevenir precocemente os eventos que podem desencadear lesões secundárias ou agravar as lesões existente.





Monitorização Neurológica Intensiva

Escala de Ramsay

- ❖ Escala de coma de Glasgow

Avaliação pupilar: h/h

- ❖ Forma
- ❖ Simetria
- ❖ Reação fotomotora

Postura anormais e déficits motores

- ❖ Focais
- ❖ Hipertonias
- ❖ Decorticação e descerebração



Monitorização Neurológica Intensiva

Pressão Intracraniana

❖ Manter até 20mmHg

Pressão de Perfusão Cerebral

❖ Manter acima de 70 mmHg

Capnometria

❖ Manter em torno de 35mmHg

Controle rigoroso dos sinais vitais

❖ h/h nas primeiras 6h



NEUROINTENSIVISMO

*INTERVENÇÃO NO PÓS
OPERATÓRIO DE CLIPAGEM
DE ANEURISMA CEREBRAL A
PARTIR DOS DIAGNÓSTICOS*



Percepção Sensorial Perturbada *Risco para Injúria*

- ✿ **Avaliação constante do nível de consciência**
- ✿ **Contenção mecânica se necessário**
- ✿ **Orientação para localização no tempo e espaço**
- ✿ **Posicionamento adequado no leito**
- ✿ **Medidas preventivas para novas lesões**

Mobilidade física no leito prejudicada
Risco de Integridade da Pele Prejudicada

- Posicionamento adequado no leito
- Mudança de decúbito
- Descompressão de Proeminências ósseas



Dor

- **Administração de analgésicos**
- **Aplicação da escala de dor**
 - **Medidas de conforto**

Padrão Respiratório Ineficaz *Risco para aspiração*

- **Aspiração de vias aéreas**
- **Posicionamento adequado do TOT**
- **Manutenção do decúbito elevado**
- **Manutenção da cabeceira elevada**
- **Aspiração de vias áreas**



Risco de Déficit Volume de Líquido

- ❖ **Controle Hídrico rigoroso**
- ❖ **Manter a euvolemia**



Risco para Infecção

- **Cuidados relacionados a inserção de cateteres**
- **Manutenção do curativo da ferida operatória limpo e seco**
- **Administração de antibióticos**



Risco de Perfusão Tissular Periférica Prejudicada

- Promover a profilaxia mecânica
- Avaliação periódica dos MMII



*“Cada um de nossos atos tem
dimensão universal.”*

(Dalai Lama, 2000)

Obrigada

elaine.moraes@bpsp.org.br

www.ineti.com.br