



Esclarecimento sobre a administração de Rocefin® (ceftriaxona dissódica) e soluções contendo cálcio

São Paulo, 9 de novembro de 2007.

Prezados profissionais de saúde,

Considerando a relevância clínica da incompatibilidade da administração simultânea de Rocefin® (ceftriaxona dissódica) e soluções contendo cálcio, particularmente em neonatos, foram ressaltadas as seguintes informações na bula do medicamento:

Contra-indicações: Rocefin® (ceftriaxona dissódica) é contra indicado em recém-nascidos sob tratamento com cálcio, devido ao risco de precipitação do sal ceftriaxona-cálcio.

Advertências e Precauções: Rocefin® (ceftriaxona dissódica) não deve ser misturado ou administrado simultaneamente com soluções ou produtos que contenham cálcio, mesmo por diferentes catéteres de infusão.

Produtos ou soluções que contenham cálcio não devem ser administrados durante as últimas 48 horas da última administração de ceftriaxona.

Foram relatados casos de reações fatais com precipitados de ceftriaxona-cálcio em pulmões e rins de neonatos e prematuros. Em alguns casos, os catéteres de infusão e os tempos de administração de ceftriaxona e de soluções contendo cálcio diferiram.

Não houve modificação adicional no perfil de risco-benefício do Rocefin® (ceftriaxona dissódica).

Esta recomendação se aplica para qualquer apresentação do Rocefin® (ceftriaxona dissódica) e deve ser adotada para qualquer paciente que receba o medicamento.

Informações adicionais podem ser obtidas através do 0800-77-20-292 ou do e-mail brasil.faleconosco@roche.com.

Atenciosamente,

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.

Maria Cristina Bezerra
Gerente Médica – Farmacovigilância

Fernando Tatsch
Gerente Médico de Grupo Viro-Nefro-Hospitalar